

- Als u overmatig bloedt (per uur raken gedurende langer dan twee opeenvolgende uren meer dan twee stuks maandverband verzadigd met bloed, en als u zich daarnaast duizelig voelt of licht in het hoofd bent, of u steeds zwakker voelt.
- Als u 38°C koorts of hoger hebt die langer dan één dag na het inbrengen van de misoprostol-tabletten aanhoudt.
- Als u langer dan één dag na het inbrengen van de misoprostol-tabletten aanhoudend moet overgeven of aanhoudend diarree hebt.
- Als u zeer ernstige, aanhoudende of verergerende lage buikpijn hebt die niet wordt verlicht door geneesmiddelen, rust of een warme kruik.

Als u kort na het (oraal) innemen van mifepriston moet overgeven, neem dan contact op met uw arts.

Als u 24 tot 48 uur na het inbrengen misoprostol in de vagina weinig of niet bloedt, neem dan contact op met de kliniek waar de misoprostol tabletten zijn ingebracht. Dit is geen noodsituatie, maar mogelijk wel een teken dat het geneesmiddel niet heeft gewerkt.

### Controle-afspraak

Het is belangrijk dat u binnen twee weken na het toedienen van de tabletten terugkomt naar de kliniek om te laten controleren of de abortus inderdaad heeft plaatsgevonden.

In zeldzame gevallen is het mogelijk dat het geneesmiddel niet werkt en dat u dus nog zwanger bent na het gebruik van Sunmedabon®. Dit gebeurt in 4,5 tot 7,8% van de gevallen. Als dit gebeurt, heeft u verdere zorg nodig om de zwangerschap te beëindigen.

### Wanneer kan ik weer seks hebben?

U hoeft niet gedurende een vaste tijd te wachten voordat u weer seks mag hebben. Als u echter wilt voorkomen dat u zwanger raakt, kunt u het beste meteen met een doeltreffend anticonceptiemiddel beginnen. Er zijn klinische studies bekend waarbij zwangerschappen ontstonden tussen de abortus en het opnieuw op gang komen van de menstruatie. Raadpleeg uw arts voor informatie over anticonceptiemiddelen.

### Vul dit schema samen met de arts of verpleegkundige in de kliniek:

Ik nam de 1e tablet in op \_\_\_\_\_  
(dag 1)

De 4 kleine tabletten  
zijn ingebracht op \_\_\_\_\_  
(na 36-48 uur)

Mijn nacontrolebezoek is op \_\_\_\_\_  
(na 10 tot 14 dagen)

Contact informatie voor hulp:  
\_\_\_\_\_

maart 2019

Polarisavenue 87  
2132 JH Hoofddorp  
Nederland


Tel. +31 (0)23 56 85501  
www.sunpharma.com

Sunmedabon®  
medische abortus

### Materiaal voor de patient

## Wat is Sunmedabon®?

Sunmedabon® bevat twee soorten tabletten (mifepriston en misoprostol) in dezelfde verpakking. Deze tabletten worden gebruikt om een vroege zwangerschap veilig en doeltreffend te beëindigen. Het gebruik van deze tabletten veroorzaakt soortgelijke bloeding en kramp zoals die bij een hevige menstruatie of miskraam optreden.



## Mag ik Sunmedabon® gebruiken?


U mag Sunmedabon® gebruiken als u negen weken of korter zwanger bent. Dit betekent dat u uw laatste menstruatie binnen de afgelopen negen weken (63 dagen) heeft gehad. Raadpleeg uw arts, verpleegkundige of verloskundige als u niet meer precies weet wanneer uw laatste menstruatie was om vast te stellen hoe lang u al zwanger bent.

Sommige vrouwen moeten geen Sunmedabon® gebruiken. Informeer uw zorgverlener voordat u Sunmedabon® gebruikt over eventuele gezondheidsproblemen die u momenteel hebt of in het verleden hebt gehad, waaronder bloedstoornissen, en eventuele geneesmiddelen die u momenteel gebruikt of in het verleden hebt gebruikt. Als u een spiraaltje draagt, vertel dat dan uw arts, verpleegkundige of verloskundige.


Als u borstvoeding geeft, stop daar dan mee zodra u de behandeling begint.

## Hoe gebruik ik Sunmedabon®?

Op dag 1 slikt u de mifepriston-tablet.



Dan, 36-48 uur later, gaat u naar de kliniek om de vier misoprostol tabletten via de vaginale route in te (laten) brengen.



Misoprostol  
0,2 mg

Nadat de misoprostol tabletten in de vagina zijn ingebracht, blijft u 30 minuten liggen.

Bij ontslag uit de kliniek krijgt u, voor zover nodig, passende medicatie mee en wordt u volledig ingelicht over de waarschijnlijke symptomen die kunnen optreden. Tevens kunt u altijd rechtstreeks telefonisch contact leggen met de kliniek, of er zelf naar toe gaan als u hier behoefte aan heeft.

## Wat moet ik verwachten na het gebruik van de tabletten?

Sommige vrouwen hebben een vaginale bloeding na het innemen van de eerste tablet (mifepriston). Dit is normaal. De vaginale bloeding en krampen beginnen gewoonlijk spoedig nadat de misoprostol-tabletten zijn ingebracht via de vagina. Deze bloeding en kramp zijn vaak heviger dan een tijdens een hevige menstruatie. Het bloed kan dik zijn en stolsels bevatten. De bloeding is gewoonlijk het hevigst gedurende de vier tot zes uur nadat de misoprostol-tabletten zijn ingebracht via de vagina, maar soms kan de (doorbraak)bloeding twee tot drie weken aanhouden.

De kramp is ook het hevigst nadat de misoprostol tabletten zijn ingebracht. U kunt geneesmiddelen tegen de pijn gebruiken, zoals ibuprofen, of een warme kruik of warmtepad op uw onderbuik leggen.

De volgende symptomen zijn normale bijwerkingen van Sunmedabon® op de dag dat de misoprostol-tabletten worden ingebracht:

- Misselijkheid
- Hoofdpijn
- (Koude) rillingen
- Koorts
- Braken
- Diarree

## Wanneer moet ik medische hulp inroepen?

Als u de volgende symptomen krijgt of andere symptomen krijgt waar u zich zorgen over maakt, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of verloskundige. Als u spoedeisende hulp inroept en u wordt behandeld door iemand die niet op de hoogte is van uw situatie, toon hem/haar dan deze brochure.