

937

270MM

KARTA PACJENTA



- Rivaroxaban Ranbaxy, 2,5 mg
- Rivaroxaban Ranbaxy, 10 mg
- Rivaroxaban Ranbaxy, 15 mg
- Rivaroxaban Ranbaxy, 20 mg

- Kartę należy zawsze przechowywać przy sobie
- Kartę należy pokazywać przed leczeniem każdemu lekarzowi lub dentyście

Co należy wiedzieć o leku Rivaroxaban Ranbaxy?

- Lek Rivaroxaban Ranbaxy rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Lek Rivaroxaban Ranbaxy należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed powstaniem zakrzepów krwi, nigdy **nie należy pomijać dawki**.
- Nie wolno przerywać przyjmowania leku Rivaroxaban Ranbaxy bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.
- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rivaroxaban Ranbaxy należy powiedzieć pracownikowi ochrony zdrowia o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym należy poinformować pracownika ochrony zdrowia, że pacjent przyjmuje lek Rivaroxaban Ranbaxy.

Kiedy należy zasięgnąć porady pracownika ochrony zdrowia?

Podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak Rivaroxaban Ranbaxy, ważne jest, aby być świadomym możliwych działań niepożądanych. Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym. Nie należy rozpoczynać przyjmowania leku Rivaroxaban Ranbaxy bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeśli pacjent wie, że jest w grupie ryzyka wystąpienia krwawienia. Należy

niezwłocznie powiadomić pracownika ochrony zdrowia, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe krwawienia, takie jak wymienione poniżej:

- ból,
- obrzęk lub dyskomfort,
- ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie,
- nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi okres czasu,
- krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z dróg rodnych o większym nasileniu niż zwykle,
- krew w moczu, która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca,
- odkrztuszanie krwi lub wymiotowanie krwią lub treścią przypominającą fusy od kawy.

Jak przyjmować lek Rivaroxaban Ranbaxy?

- W celu zapewnienia optymalnej ochrony, lek Rivaroxaban Ranbaxy
 - 2,5 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia
 - 10 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia
 - 15 mg trzeba przyjmować z jedzeniem
 - 20 mg trzeba przyjmować z jedzeniem.

5248107-0124-00
937

<p>Jestem poddawany(-a) leczeniu przeciwzakrzepowemu lekiem Rivaroxaban Ranbaxy (rywaroksaban)</p>	<p>W nagłym przypadku należy powiadomić:</p>	<p>Należy również powiadomić:</p>
<p>Imię i nazwisko</p>	<p>Imię i nazwisko lekarza</p>	<p>Imię i nazwisko</p>
<p>Adres</p>	<p>Telefon lekarza</p>	<p>Telefon</p>
<p>Data urodzenia</p> <p>Masa ciała</p>	<p>Pieczętka lekarza:</p>	<p>Pokrewieństwo</p>
<p>Inne leki i choroby</p>		<p>Informacja dla pracownika ochrony zdrowia</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wskaźnik INR nie jest właściwy do pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej leku Rivaroxaban Ranbaxy i z tego powodu INR nie może służyć do monitorowania leczenia lekiem Rivaroxaban Ranbaxy.

